T. 67.

Lacertus cauda cærulea.

LACERTUS CAUDA CÆRULEA.

The Blue-Tail Lizard.

THIS Lizard is usually small, seldom exceeding six Inches in Length, the Head short, the Tail is blue, the rest of the Body brown; except that from the Nose runs five yellow Lines at equal Distances, along the Back to the Tail. They are seen often on the Ground, and frequent hollow Trees. Some People suspect them to be venomous, tho' I never heard of an Instance to confirm it. They are found in *Virginia* and *Carolina*.

Lezard à la queuë bleuë.

CE Lezard eſt ordinairement petit, n'ayant guères que ſix pouces de long; ſa tête eſt courte, ſa queuë bleue, & le reſte du corps brun, excepté qu'il y a cinq lignes jaunes qui s'étendent depuis le nez parallellement le long du dos juſques à la queuë; on les voit ſouvent ſur la terre, & ils frequentent les arbres creux. Il y a des gens qui les ſoupçonnent d'être venimeux; quoyque je n'aye jamais oüi parler d'accident qui confirme cette opinion. On les trouve à la Virginie *& à la* Caroline.

ANONA fructu viridi lævi, Pyri inverſi forma.

THIS Shrub grows usually to the Height of about ten or twelve Feet, the Branches grow with Bendings, at the Distances of two Inches from one another, at the Angles of which shoot forth its Leaves alternately, which in Shape are like those of the Bay-Tree, with very short Footstalks. The Flowers hang single on Footstalks, about an Inch long, and are composed of six Petals, *viz.* Three which are round and white, and three larger green ones, which are pointed, and cover the round ones: In the middle of the Flower appears the *Ovarium*, encircled with pappous yellow *Stamina*. The Flower when spread open is in Form of a Triangle: The Fruit is in Form somewhat like a Pear inverted, and as big as One of the largest Size, covered with a smooth green Skin, which contains a Pulp like that of an over ripe Pear, with many conic dark brown Seeds, placed at Distances within the Fruit. These, with most of the other Kinds of *Anona*, are Food for *Guana*'s, smaller Lizards, and other Animals: These are Natives of *Hispaniola*, *Ilathera*, *Andros* Isles, &c. but no where North of the Northern *Tropic*.

The Fruit of some of the Sorts of *Anona* have from their Taste obtained among the *English* the Names of Custard Apple, Sugar Apple, and Sowr Sops.

*CET arbriſſeau s'élève ordinairement à la hauteur de dix ou douze pieds; les branches croiſſent avec des coudes éloignés de deux pouces, l'un de l'autre: des angles deſquels naiſſent des feuilles alternes, qui reſſemblent par leur forme à celle du Laurier, & dont les queuës ſont très courtes: Les fleurs pendent, chacune par un pedicule d'environ un pouce de long, elles ſont compoſées de ſix petales, dont trois ſont rondes & blanches, & trois autres plus grandes ſont vertes & pointuës, & couvrent les rondes; l'ovaire paroît au milieu de la fleur, entouré d'étamines jaunes & à aigrettes, lorſque la fleur eſt entierement ouverte elle eſt triangulaire; leur fruit reſſemble un peu à une poire renverſée, & il eſt de la taille d'une des plus groſſes, il eſt couvert d'une peau verte & liſſe, qui renferme une pulpe ſemblable à celle d'une poire trop mure, & pluſieurs ſemences coniques d'un brun foncé, éloignées les unes des autres dans le fruit. Cette eſpèce d'*Anona, *comme la plûpart des autres, ſert à nourrir les Guannas, les petits Lezards & d'autres animaux. Elle eſt originaire des Iſles St.* Domingue, Ilathera, Andros, &c. *mais on n'en voit nulle part au delà du* Tropique *ſeptentrional.*

*Les fruits de quelques eſpèces d'*Anona *ont été nommés par les* Anglois, *à cauſe de leur goût, pommes de ſucre, pommes de crême, pommes aigres.*